

تعریف سندرم کاوازاکی:

کاوازاکی یک بیماری حاد تبار در بچه هاست که موجب التهاب منتشر عروق کوچک و متوسط می شود.

این بیماری بطور شایع در بچه های زیر ۵ سال بروز می کند و در بالغین بندرت دیده می شود.

علت بیماری:

علت این بیماری ناشناخته است. به نظر می رسد پاسخ غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن به یک عامل عفونی می باشد.

علائم بیماری:

شروع بیماری بطور عمده ناگهانی است و با تب بالا و مداوم که یک هفته یا بیشتر طول می کشد و به درمان آنتی بیوتیکی پاسخ نمی دهد.

التهاب و قرمزی ملتحه چشم و حساسیت به

نور

التهاب و قرمزی مخاط دهان و زبان

لب های قرمز و ترک دار

بثورات و برجستگی های قرمز رنگ پوستی در

پشت سینه، شکم یا کشاله ران

قرمزی و ورم دستها و پاها

بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن

بیقراری کودک

مهمترین عارضه این بیماری، بروز سکته قلبی

است که با علائم درد شکم، استفراغ، بی

قراری، گریه تسکین ناپذیر، رنگ پریدگی و

شوک بروز می کند.

روشهای تشخیصی:

گرفتن شرح حال بیماری، علائم ظاهری بیمار،

آزمایش ادرار، آزمایش خون، اکو قلب، نوار

قلب، و آنژیوگرافی.

درمان:

• بستری کردن بیمار در بیمارستان

• تزریق ایمونوگلوبولین وریدی

• تجویز استروئیدها (پردنیزولون) جهت

کاهش التهاب

• کاهش تب با استفاده از داروهای تب بر

طبق دستور پزشک

• تجویز داروی آسپرین جهت کاهش التهاب

و جلوگیری از ایجاد لخته در رگها طبق

دستور پزشک

• تجویز سایر داروهای ضد لخته (وارفارین یا

هپارین)

• کنترل مایعات خورده شده و دفع شده و

توزین روزانه کودک

• جراحی در موارد شدید برای رفع انسداد

عروق قلب

مراقبت ها:

پی گیری مکرر و دقیق عملکرد قلب با انجام تست ورزش

مصرف مایعات و غذاهای نرم به علت زخم دهان

استفاده از لباس های خنک جهت به حداقل رساندن تحریک پوستی

فراهم کردن محیط آرام جهت حفظ آرامش در کودک

کنترل درجه حرارت کودک و در صورت تب بالا تماس گرفتن با پزشک

انجام فعالیت های در حد تحمل

توجه به علائم مسمومیت با داروها (وزوز گوش، سردرد، سرگیجه، سوزش سردل و.....)

واکسیناسیون با ویروسهای زنده مانند سرخجه، سرخک، و اوریون تا ۳ ماه بعد از تزریق ایمونوگلوبولین وریدی به تاخیر بیفتد. تا بدن بتواند بطور طبیعی پادزهر لازم را بسازد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان

سندرم کاوازاکی

تهیه کننده: پرستو عبدالمهی

استاد راهنما:

سرکار خانم حیاتی